

esthetic

world



Bronceado
responsable

Obesidad
epidemia del
siglo XXI

Primicia
Sinergia
fotosensibilizante

ZONA SPA

abril 2007 nº 53



Reparación de la pared abdominal en las dermolipectomías

DR. JAVIER BISBAL
Cirugía Plástica
Clínica Planas, Barcelona

Las consultas para tratamiento estético quirúrgico del abdomen, nos van a plantear con cierta frecuencia, situaciones en las que la integridad de la pared abdominal puede estar afectada.

En general son cuatro las causas más frecuentes de deformidad estética de abdomen: relajación dermograsa, obesidad y lipodistrofias, cicatrices, y abultamientos causados por deficiencias de la pared abdominal. La cirugía de dermolipectomía y de liposucción puede solucionar estos casos, pero también pueden ser un fracaso, al persistir abultamientos o deformidades si no se han tratado simultáneamente los posibles defectos de la pared.

OBESIDAD

Obesidad con grandes alteraciones de la pared abdominal

Hernias, eventraciones, diastasis, debilidad o atonía muscular, precisarán nuestra atención para proceder desde un punto de vista tanto funcional como estético. El defecto de pared más frecuente es la diastasis de los músculos rectos del abdomen, es decir, la separación de los mismos en la línea media, como consecuencia generalmente de las dilataciones producidas en los embarazos.

En función del grado de separación disminuirá la resistencia de la pared y podrán aparecer entre ellos abultamientos causados por la protusión de elementos intraabdominales, que si son importantes recibirán el nombre de eventraciones. Con cierta frecuencia podemos encontrar hernias. Estas pueden ser primarias si se originan en puntos anatómicos débiles, o hernias incisionales cuando son consecuencia de laparotomías (intervenciones quirúrgicas

abdominales) y pueden aparecer en cualquier incisión practicada en el abdomen, en este caso se denominarán también eventraciones. En las grandes obesidades prolongadas largo tiempo, es fácil encontrar una atonía o debilidad general de la pared abdominal, que será totalmente incapaz de soportar la presión de las vísceras y mantendrá un gran abultamiento.

Antes de la cirugía deberemos hacer un planteamiento que deberá basarse en múltiples parámetros, que irán desde el grado de afectación de la pared, edad de la paciente y posibilidad de embarazos, hasta un estudio de la capacidad respiratoria en función de la presión intraabdominal. Estos factores determinarán el tipo de operación a efectuar o incluso podrían contraindicarla, así por ejemplo, pacientes muy obesos con abdómenes grasos a gran tensión precisarán un tratamiento previo de adelgazamiento.

depilève®

ceras epilatorias
3ª Generación

3G

BRONZE WAX
FOR MEN

máximo arranque

depilève®
3G
BRONZE WAX
FOR MEN

SaberComprar Infórmate en el tel.: 902 100 021